

(*Pseudobacciger harengulae*)

Svenskt vardagsnamn	Saknas
Vetenskapligt namn	<i>Pseudobacciger harengulae</i> Synonym: <i>Bacciger harengulae</i>
Organismgrupp	Fylum Platyhelminthes, plattmaskar. Klass Trematoda, sugmaskar. Subklass Digenea.
Storlek och utseende	Sugmasken är en parasit med flera mellanvärdar. Då den har hittats i fisk har den en oval kropp som är ca 370-1130 µm lång och 280-650 µm bred. Huden är helt täckt med tunna taggar och den har två sugkoppar, en runt munnen och en på magen.
Kan förväxlas med	<i>Pseudobacciger manteri</i> . Vissa studier pekar på att karaktärerna är så variabla att arterna måste utredas ytterligare. Jämförande genetiska studier har ej utförts.
Geografiskt ursprung	De första fynden av <i>Pseudobacciger harengulae</i> gjordes i Japan 1938.
Första observation i svenska vatten	I Sverige upptäcktes <i>Pseudobacciger harengulae</i> för första gången i mitten av 1990-talet på västkusten. Den upptäcktes då för första gången som inälvsparasit hos juvenil fisk och det var också första gången sill (<i>Clupea harengus</i>) noterades som värd.
Förekomst i svenska havs- och kustområden	<i>Pseudobacciger harengulae</i> har hittills bara observerats på svenska västkusten i studier utförda mellan 1994-1996.
Övrig förekomst i olika havsområden	<i>Pseudobacciger harengulae</i> har identifierats i Japan, Korea, Florida i USA, Indien, Namibiska kusten i östra södra Atlanten och i Svarta havet.
Troligt införselsätt	Ballastvatten.
Miljö där arten förekommer	Arten förekommer i marin miljö och har före fyndet i Sverige främst återfunnits i tropiska och subtropiska miljöer. <i>Pseudobaccigers</i> första mellanvärd är olika arter av musslor. I samma område som arten återfanns i Sverige återfanns samtidigt en introducerad knivmussla (<i>Ensis directus</i>) ur vars familj andra arter i andra länder är kända mellanvärdar.
Ekologiska effekter	Bör kunna ha ekologiska effekter då sill är en kommersiellt viktig art.
Andra effekter	Ej känt.
Övrigt	
KÄLLOR TILL FYNDLOKALER OCH ARTBESTÄMNING	

- Rahimian, H. (2007). "Parasites of fingerling herring *Clupea harengus* L.: Ecology and fine morphology." Journal of Helminthology **81**: 199-217.
- Rahimian, H. and J. Thulin (2003). "*Pseudobacciger harengulae* from the Atlantic herring *Clupea harengus*: a new host and locality record." Journal of Helminthology **77**: 69-75.
- Dimitrov, G. I., R. A. Bray, et al. (1999). "A redescription of *Pseudobacciger harengulae* (Yamaguti, 1938) (Digenea: Faustulidae) from *Sprattus sprattus phalericus* (Risso) and *Engraulis encrasicolus ponticus* Alexandrov off the Bulgarian Black Sea coast, with a review of the genus *Pseudobacciger* Nahhas & Cable, 1964." Systematic Parasitology **43**: 113-146.

Detta faktablad om *Pseudobacciger harengulae* skapades den 30 november 2009 av Katja Norén.