

Desinfektion och hantering av utrustning för att förhindra smittspridning mellan vattendrag

Parasiter och bakterier kan överleva i fuktiga miljöer i flera dagar och sprids med fiskeredskap, båtar och vatten från infekterade vattendrag eller sjöar.

Alla som rör sig mellan olika älvar, sjöar, åar eller bäckar behöver hjälpa till att förhindra smitta sprids till nya platser.

Åtgärder för att förhindra smittspridning

Töm, tvätta, torka eller desinficera fiskeutrustningen, båten eller andra redskap du använt i vattnet innan du flyttar den mellan eller inom vattendraget.

Kemisk desinfektion av fiskeutrustning

- Samtliga föremål som desinficeras ska vara tömda på allt vatten och rengjorda innan desinfektionen påbörjas.
- Brukslösning (här 1 % Virkon-S som exempel) blandas genom att tillsätta 10 g pulver eller en dospåse (a 10 g) per liter vatten. Virkon S, eller motsvarande godkända desinfektionsmedel finns där du kan köpa medicin till djur eller för landbruksbehov.
- Mindre föremål kan sänkas ner eller tvättas med brukslösningen, större föremål kan duschas med brukslösning.
- Verkningstiden är 20 minuter.
- Efter avslutad desinfektion ska föremålen sköljas med vatten, då Virkon S har en korrosiv effekt samt för att undvika bildning av vita fläckar efter upptorkning.

Läs alltid instruktioner på förpackningen.

Torkning av fiskeutrustning

Du kan torka utrustningen istället för att desinficera den:

- Lufttorkning i minst 2 dagar i en temperatur på 20° C eller högre.
- Värmebehandling i minst 1 timme i temperatur 60° C.



STATENS
VETERINÄRMEDICINSKA
ANSTALT

