


Att skapa nätverk - konnektivitet

- Bygger på en larvspridnings-modell som tagits fram av Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.
- Larvstudie (fält, litteratur)
- 5 typlarver, med olika spridningsdjup och spridningslängd
- Täcker området ner till 100 meter
- Rapport:
<http://hdl.handle.net/2077/35530>
inklusive redogörelse för olika artgruppers larvbeteende



Drivdjup (m)	Drivtid (d)	Ex. på taxa	Kod
0% 0-2 m 20% 10-12 m 40% 22-24 m 40% 48-50 m	100% 10 dagar	Anthozoa, Crinoidea	C1
0% 0-2 m 20% 10-12 m 40% 22-24 m 40% 48-50 m	100% 30 dagar	Ophiurida, <i>Luidia sarsi</i> , Paguridae, <i>Pisidia</i> sp. <i>Limanda limanda</i>	C2
10% 0-2 m 40% 10-12 m 40% 22-24 m 10% 48-50 m	100% 30 dagar	Echinoida, Spionida, <i>Sabella</i> sp. <i>Nephrops norvegicus</i> <i>Corystes cassivelanuas</i>	C3
10% 0-2 m 40% 10-12 m 40% 22-24 m 10% 48-50 m	100% 60 dagar	<i>Artica islandica</i> , <i>Cancer pagurus</i> Gadidae spp.	C4
40% 0-2 m 30% 10-12 m 20% 22-24 m 10% 48-50 m	100% 30 dagar	<i>Calocaris macandrea</i> <i>Liocarcinus navigator</i> <i>Platichtys flesus</i>	C5



Studie av de djupa områden i Skagerrak

- Konnektivitet för Bratten, Koster-Väderöfjorden och Gullmarn, identifiering av viktiga källor och sänkor
- Komplettering av tidigare studier; samma larvtyper, annan strömningsmodell
- DHI Sverige

